



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REMODELACIÓN FACIAL CON MATERIAL DE RELLENO

D./Dña.:de.....años de edad.
(Nombre y dos apellidos)
con domicilio en
y D.N.I.nº en calidad
de.....
(Representante legal, familiar o allegado) (Nombre y dos apellidos del paciente)

Autorizo al Dr./ay a su equipo a intervenirme según hemos acordado verbalmente y por escrito. **Reconozco y comprendo el proceso al cuál voy a ser sometido/a**, tanto en su diagnóstico, pronóstico y tratamientos que el doctor y su equipo consideren oportunos.
Reconozco que una vez leídos los siguientes puntos, incluyendo las complicaciones inherentes a este procedimiento, acepto llevar a cabo el tratamiento, **consciente de los riesgos y beneficios** de dicho procedimiento.
He sido correctamente informado de los métodos alternativos de tratamiento para mi caso, pero opto, consciente y libremente por un/ una: REMODELACIÓN FACIAL CON MATERIAL DE RELLENO

Considero este tratamiento necesario para mí, ya que siento preocupación por mi problema y creo que esta es la mejor manera de resolverlo de todas las que me han explicado.

Reconozco y acepto que en cirugía y medicina estética (y este procedimiento lo es) **no se pueden dar garantías ni seguridad absolutas en cuanto al resultado de los procedimientos ni salud del paciente**, ya que en estos intervienen, a lo largo del trans y del postoperatorio, factores y variables independientes de la técnica, el material y los instrumentos utilizados.

Autorizo la obtención de documentación icnográfica sobre mi caso, que sirva para una correcta valoración diagnóstica, terapéutica y de resultados. Esta información puede ser utilizada para fines de difusión científica y académica, así como para evaluación de resultados.

Fecha.

Firma Dr.:

Firma paciente:

MATERIAL DE RELLENO

Los implantes inyectables son empleados la mayoría de las veces en la región facial, aunque también pueden ser beneficiosos en otras partes del cuerpo, y son utilizados para rellenar:

- Arrugas y líneas de envejecimiento: Faciales, en labios, comisuras de la boca, entrecejo, cuello, alrededor de los ojos (perioculares) o de la boca (periorales), etc.
- Surcos profundos: naso-labial (desde la nariz hasta la boca) o glabellares (líneas entre las cejas), Rictus, etc.
- Cicatrices de acné u otros tipos de defectos tisulares.



O para dar volumen y/o moldear:

- En Cara: Labios, pómulos, mentón, mandíbula, frente, ángulos mandibulares, nariz, etc.
- En Cuerpo: Mamas, Pectorales, rodillas, glúteos, gemelos, defectos congénitos o adquiridos, secuela de accidentes, etc.
- En pacientes con tratamiento VIH.
- En las atrofas y asimetrías faciales.

Los Materiales de relleno son todos aquellos productos utilizados para proporcionar volumen en alguna parte del cuerpo. Dentro de los materiales de relleno podemos diferenciar, principalmente, dos tipos: los injertos y los implantes.

Los primeros son tejidos extraídos del mismo individuo y transportados a otra parte de su cuerpo, sin mantener ningún tipo de conexión vascular con la zona donante (injerto autólogo), tejidos de otro individuo de la misma especie (injerto homólogo) o de otra especie (injerto heterólogo). Como ejemplo de estos tenemos el injerto de grasa propia (injerto autólogo), el injerto de cartílago de otra persona (injerto homólogo) o los injertos de piel, cartílago y colágeno bovino (injerto heterólogo).

Por otra parte, un implante es todo material no orgánico introducido en el organismo. Se han empleado infinidad de materiales con este fin: cera, marfil, y más recientemente, Plásticos (poliuretano y polietileno), Elastómeros (siliconas y metacrilato), Politetrafluoretileno expandido (PTF-E), Metales (titanio, vitalio, oro y acero) y producto textiles (Dacron®, Teflón® y Gore-tex®).

Indicamos los implantes en caso de hipotrofia, atrofia o pérdida, tanto de tejidos blandos como de hueso, y si no disponemos de materiales propios o su obtención no está justificada por ser más cruenta o no mejorar el resultado alcanzado con el implante.

Los implantes inyectables son aquellos materiales que pueden ser introducidos en el organismo mediante inyección. Según su origen se clasifican en biológicos (de origen orgánico) y no biológicos (de origen sintético) y según su duración en: *reabsorbibles* e *irreabsorbibles*.

Implantes reabsorbibles o temporales

Los rellenos inyectables temporales, biodegradables, poseen una duración limitada entre los 6 y, como mucho, los 24 meses. Los productos más frecuentemente utilizados son los derivados del colágeno (autólogo o bovino), hidroxapatita calcica (Radiesse®), ácido hialurónico (de origen animal o de síntesis, por ejemplo Hilaform®, Restylane®, Juvederm®, Macrolane®), o carboximethyl celulosa (erelle) que es un homopolisacárido sintetizado ya presente en las células animales o vegetales como parte de su estructura. Otro producto con las características de reabsorbible es el ácido poliláctico (antes llamado New Fill® y actualmente Sculptra®) cuya duración oscila entre los 12 y 18 meses.

Implantes irreabsorbibles o permanentes

Son definitivos, es decir, no reabsorbibles y entre ellos cabe destacar: Metacrilato (Artecoll y Dermalive), Acrilamidas (Aquamid y Evolution), y Polialquilimidias (Bioalcamid). La silicona líquida, en forma de microgránulos o biopolímeros pertenece al grupo de los compuestos inorgánicos irreabsorbibles y su utilización con fines estéticos está prohibida en nuestro país.

Otro material de relleno es la propia grasa del paciente, y FCP (factores de crecimiento plaquetario), convenientemente tratada a fin de intentar que se integre adecuadamente a los tejidos, se obtiene mediante lipoaspiración, se decanta, se centrifuga y se aplica mediante cánulas especiales.

La aplicación de estos productos es un procedimiento que se realiza en consulta, de manera ambulatoria y que se puede realizar sin anestesia o en algunos casos con anestesia loco-regional, el tratamiento puede consistir en una sola aplicación o en varias sesiones dependiendo del material, de la zona tratada y cantidad de volumen necesario.



1. Consejos previos a la colocación de implantes de relleno

- No tomar aspirinas u otros medicamentos que contengan salicilatos durante dos semanas antes y dos semanas después del tratamiento.

2. El día del procedimiento

- No es necesario que venga en ayunas
- No se maquille ni utilice cremas en la zona que se va tratar.

3. Recomendaciones después del procedimiento

- Puede haber ligero dolor en la zona tratada.
- Inflamación que disminuye a partir de las 48-72 horas y es mínimo a la semana.
- Equimosis (moratones) que van desapareciendo a partir de los 5 a 7 días y pueden durar hasta 2 semanas.
- Sensación de calor local.
- En el caso de implante de prótesis faciales, en las primeras 48 h., puede aparecer un pequeño sangrado y/o secreción sero-sanguinolenta.
- El tratamiento analgésico y antibiótico ha de ser seguido por el tiempo y en las dosis recomendadas.
- En caso de implantes faciales No comer sólidos o gesticular en exceso unas horas después del procedimiento.
- Reposo relativo de las zonas infiltradas

4. Complicaciones

Cualquier procedimiento quirúrgico y/o tratamiento entraña un cierto grado de riesgo y es importante que usted comprenda los riesgos asociados a estos. La decisión individual de someterse a un tratamiento se basa en la comparación del riesgo con el beneficio potencial. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted deberá discutir cada una de ellas con su cirujano plástico para asegurarse de que comprende los riesgos, complicaciones potenciales y consecuencias de los implantes de relleno.

4.1. Anestesia.

En ocasiones puede existir riesgo de reacciones alérgicas a la aplicación de cremas anestésicas, o anestésicos locales, en caso de aparecer pueden ser tratados sintomáticamente.

4.2. Eritema

En el período postoperatorio inmediato es normal que existan eritemas (enrojecimiento) y edemas (hinchazón), en ambos casos son eventos pasajeros que se resuelven a las pocas horas o días del tratamiento, en los casos de relleno mediante la propia grasa esta inflamación puede ser mucho mas prolongada aunque al cabo de un par de semanas puede haber desaparecido.

4.3. Sensibilidad

Pueden aparecer alteraciones neurológicas en la zona tratada: anestesia transitoria o definitiva, dolor, picores u otras sensaciones extrañas (parestias). También es posible que se presenten alteraciones de la movilidad muscular transitorias o definitivas (paresia o parálisis).

4.4. Inflamación

Aunque no es frecuente, con estos productos pueden aparecer reacciones de cuerpo extraño (hipersensibilidad) o incluso reacciones alérgicas que generen inflamación y enrojecimiento, que generalmente es temporal, en caso contrario puede ser necesario retirar el producto o cambiar de material.

4.5. Infección



La infección después del tratamiento es muy rara. Si ocurre una infección, puede ser necesario tratamiento adicional, incluyendo antibióticos o en caso necesario retirar el producto.

4.6. Permanencia y posición

Cuando implantamos material de relleno reabsorbible o grasa puede desaparecer de forma prematura, en lapsos de tiempo menor al indicado por el fabricante, o proveer menor volumen del esperado, por lo que pueden ser necesarias nuevas infiltraciones adicionales a las pautadas originalmente. (Ver retoques).

Si es material duradero pueden aparecer nódulos de fibrosis, quistes, eritema (rojez) persistente y extrusión o desplazamiento del material. Se reportan casos de enquistamientos y tumoraciones que deben ser resecados quirúrgicamente.

4.8. Resultado insatisfactorio.

Existe la posibilidad de un resultado insatisfactorio al aplicar implantes de relleno, incluso después de varias sesiones. Usted puede no estar de acuerdo con los resultados del tratamiento. De forma infrecuente es necesario realizar tratamientos adicionales para mejorar los resultados.

4.9. Retoques:

Llamamos retoque a las sesiones extraordinarias a las inicialmente indicadas, con la finalidad de mejorar o complementar el resultado obtenido.

Si el paciente lo desea o el cirujano lo considera oportuno para mejorar el resultado del tratamiento se podrá llevar a cabo un retoque, el cual suele ser una o dos aplicaciones que corrijan el resultado inicial

Los costes del material empleado en el retoque deben ser asumidos por el paciente. En todos los casos, esos gastos serán siempre muy inferiores a la primera aplicación, así mismo recalcamos que el doctor se hace responsable de su propio trabajo pero no de los medios necesarios para conseguirlos.

5. Resultado Final

El resultado parcial se verá posterior a cada sesión, no siendo definitivo hasta pasados el número de sesiones indicados por el médico. La gran mayoría de pacientes quedan muy satisfechos / as con este tipo de tratamiento, ya que proporciona una solución rápida, asequible y natural o pequeños defectos o alteraciones estéticas.

Declaro:

Que he comprendido la información recibida en un lenguaje claro y sencillo y he podido formular todas las preguntas que he considerado oportunas.

Que el tratamiento descrito es una de las indicaciones establecidas en medicina y cirugía facial para la solución de mi problema no existiendo contraindicación para su realización; siendo consciente de que no existen garantías absolutas de que el resultado del tratamiento sea el más satisfactorio, existiendo la posibilidad de fracaso.

Que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar este consentimiento.

Que se me ha ofrecido una copia de este documento.

Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento.



CONSIENTO

QUE SE ME REALICE EL TRATAMIENTO de REMODELACIÓN FACIAL CON MATERIAL DE RELLENO

así como las maniobras u operaciones que sean necesarias durante la intervención quirúrgica

Ena.....de.....

Fdo.:El/la Médico

Fdo.: El Paciente

Fdo.:El representante legal, familiar o allegado